



Bollettino della Qualità dell'Aria N.50

Settimana di riferimento: 15.12.2008 - 21.12.2008

Autore:

Centro Regionale della Qualità dell'Aria
Andrea BOLIGNANO
Matteo MORELLI
Pierantonio DI LEGGE

E-mail:

craria@arpalazio.it

Responsabile:

Dr. Roberto SOZZI

24 dicembre 2008

Indice

1	Introduzione	2
2	Il quadro meteorologico settimanale a scala sinottica	3
2.1	15.12.2008 Lunedì	4
2.2	16.12.2008 Martedì	5
2.3	17.12.2008 Mercoledì	6
2.4	18.12.2008 Giovedì	7
2.5	19.12.2008 Venerdì	8
2.6	20.12.2008 Sabato	9
2.7	21.12.2008 Domenica	10
3	Localizzazione delle postazioni di misura della Rete Regionale della Qualità dell'Aria di ARPALAZIO	11
4	Sintesi delle medie settimanali	13
5	Standard della Qualità dell'Aria	14
5.1	Provincia e Comune di Roma	14
5.2	Provincia di Frosinone	15
5.3	Provincia di Latina	16
5.4	Provincia di Rieti	17
5.5	Provincia di Viterbo	17
6	Andamento Settimanale	18
6.1	Stazioni urbane	18
6.2	Stazioni di fondo	19
6.3	Rapporto della concentrazione di PM2,5 su PM10	20
6.4	Variazione infragiornaliera	21
6.5	Rapporto della concentrazione di NO2 su NOX	22
6.6	Radiazione Globale	23
6.7	Ozono	24
7	Link utili	25

1 Introduzione

Scopo del Bollettino Settimanale della Qualità dell'Aria é principalmente quello di presentare in maniera complessiva, chiara, semplice e dettagliata i livelli di concentrazione delle principali sostanze inquinanti rilevate dalle postazioni di misura della rete automatica di monitoraggio, settimana dopo settimana, su tutto il territorio regionale. La scelta delle sostanze inquinanti, le unità di misura e gli indicatori adottati per quantificarne i livelli (concentrazione media oraria, concentrazione media giornaliera, ecc.) é del tutto congruente con la normativa vigente (DLgs. 351/99, DM 60/2002, DLgs 183/2004). Oltre a ciò, particolare cura é stata posta sul fornire un quadro complessivo, a livello regionale, visto che il trasporto, la dispersione e la trasformazione in aria degli inquinanti sono fenomeni prevalentemente a mesoscala, difficili da cogliere e da giustificare con un'analisi puramente locale delle misure.

Dato che l'inquinamento non é un fenomeno a carattere puramente locale e non é influenzato solo dalle emissioni, é indispensabile, per comprendere le sue evoluzioni nello spazio e nel tempo, fornire sistematicamente le informazioni meteorologiche necessarie a giustificare il trasporto delle masse d'aria e la capacità disperdente delle stesse, il tutto a livello sinottico e per ogni giorno della settimana. Oltre al quadro meteorologico sinottico, sarebbe necessario presentare il quadro micrometeorologico relativo, cosa che costituirá la prossima evoluzione del bollettino.

Si prevede che durante l'anno il bollettino possa migliorare sempre piú, sia nella sua veste grafica che nei contenuti, in modo da consentire la conoscenza dello stato della qualità dell'aria nella regione con sempre maggiore chiarezza e dettaglio.

Saremo particolarmente felici di ricevere tutti i suggerimenti che riterrete opportuni e le segnalazioni di errori e omissioni.

Dott. Roberto Sozzi
Direzione Tecnica Div. Atmosfera e Impianti

2 Il quadro meteorologico settimanale a scala sinottica


Per caratterizzare lo stato delle masse d'aria durante la settimana ed il loro movimento, si utilizzano alcuni dei campi meteorologici prodotti da meteorologi nell'ambito dell'analisi e previsione dello stato della troposfera. Per semplificare la presentazione qui di seguito riportata, si è operato come segue:

- Le carte sono state ottenute da EuroMETEO (<http://www.eurometeo.com>), Aeronautica Militare (<http://www.am.it>), Met Office (<http://www.metoffice.gov.uk>)
- Si riferiscono alle prime ore di ogni giorno
- Si limitano a descrivere sinteticamente alcune variabili meteorologiche ben note come pressione atmosferica, velocità e direzione del vento, temperatura, pioggia e copertura totale del cielo
- ad eccezione della copertura totale del cielo tutti i campi sono al livello del suolo.


In particolare, i campi fornite per ogni giorno sono:

1. La distribuzione barica su tutta Europa ed i fronti presenti. In tale carta sono rappresentate le isobare (linee che racchiudono zone ad eguale pressione), i fronti freddi (indicati con linee su cui sono posti triangoli col vertice orientato nella direzione del movimento delle masse d'aria) e i fronti caldi (linee con semicerchi orientati sulla direzione del moto). Questa carta sinottica fornisce sinteticamente un quadro del movimento delle masse d'aria e delle loro caratteristiche termiche.
2. La distribuzione barica sull'Italia. La presenza e la localizzazione delle zone anticicloniche (ad alta pressione) e cicloniche (a bassa pressione) consente di aumentare il dettaglio del campo di moto dell'atmosfera presente sull'Italia e di fornire, almeno in termini qualitativi, la convettività presente.
3. La distribuzione della direzione e velocità del vento, che migliora la conoscenza del movimento a mesoscala delle masse d'aria.
4. La distribuzione della temperatura nell'aria, che, tra l'altro, può fornire utili indicazioni sulla chimica della troposfera.
5. La distribuzione della copertura totale del cielo che consente la stima della radiazione solare globale e, quindi, del livello di convettività dell'aria, cioè della sua capacità disperdente.
6. La distribuzione della pioggia che da un lato rafforza la conoscenza dello stato disperdente dell'atmosfera e dall'altro indica la presenza dei fenomeni di deposizione umida e di dilavamento dell'aria.


2.1 15.12.2008 Lunedì




Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo




Carta sinottica dell'Italia al suolo



Campo di vento superficiale



Campo di temperatura superficiale



Precipitazione


Situazione: L'Italia è nuovamente interessata da un'intensa perturbazione, collegata ad un minimo depressionario che tra oggi e mercoledì persisterà tra Sardegna, Corsica e Tirreno centrale.

Venti: moderati sciroccali con rinforzi sulle coste


Temperature: in leggero aumento

Fenomeni: piogge e rovesci su tutte le regioni, localmente abbondanti specie sul versante tirrenico. Neve oltre i 1300m


2.2 16.12.2008 Martedì




Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo




Carta sinottica dell'Italia al suolo



Campo di vento superficiale



Campo di temperatura superficiale



Precipitazione


Situazione: Una circolazione depressionaria, attualmente centrata ad ovest della Sardegna, interessa gran parte della nostra penisola. Nei prossimi giorni la depressione si muoverà lentamente verso sud-est, consentendo un lento miglioramento a partire dalle regioni settentrionali.

Venti: moderati o localmente forti meridionali


Temperature: stazionarie

Fenomeni: piogge e rovesci su tutte le regioni al mattino, anche abbondanti sul Lazio, in localizzazione dal pomeriggio sulle coste della Toscana. Neve a 1200-1300m


2.3 17.12.2008 Mercoledì




Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo




Carta sinottica dell'Italia al suolo



Campo di vento superficiale



Campo di temperatura superficiale



Precipitazione


Situazione: Una circolazione depressionaria, attualmente centrata ad ovest della Sardegna, interessa gran parte della nostra penisola. Nei prossimi giorni la depressione si muoverà lentamente verso sud-est, consentendo un lento miglioramento a partire dalle regioni settentrionali.

Venti: moderati o localmente forti meridionali


Temperature: stazionarie

Fenomeni: piogge e rovesci su tutte le regioni al mattino, anche abbondanti sul Lazio, in localizzazione dal pomeriggio sulle coste della Toscana. Neve a 1200-1300m


2.4 18.12.2008 Giovedì




Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo




Carta sinottica dell'Italia al suolo



Campo di vento superficiale



Campo di temperatura superficiale



Precipitazione


Situazione: La depressione che da più giorni staziona sull'Italia va ormai definitivamente colmandosi e spostandosi verso i Balcani; nel frattempo un'area di alta pressione si sta rafforzando sull'Europa occidentale.

Venti: deboli o moderati settentrionali


Temperature: in leggera diminuzione

Fenomeni: piogge sparse sul versante adriatico


2.5 19.12.2008 Venerdì




Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo




Carta sinottica dell'Italia al suolo



Campo di vento superficiale



Campo di temperatura superficiale



Precipitazione


Situazione: sull'Italia e sull'Europa centro-occidentale tornano a ristabilirsi condizioni anticicloniche, in ulteriore rafforzamento nei prossimi giorni.

Venti: deboli o moderati settentrionali


Temperature: stazionarie

Fenomeni: piogge sparse sulle regioni adriatiche


2.6 20.12.2008 Sabato




Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo




Carta sinottica dell'Italia al suolo



Campo di vento superficiale



Campo di temperatura superficiale



Precipitazione


Situazione: Sull'Italia e sull'Europa centro-occidentale torna l'alta pressione e tenderà a rinforzarsi nei prossimi giorni.

Venti: deboli o localmente moderati nord-occidentali


Temperature: stazionarie

Fenomeni: assenti


2.7 21.12.2008 Domenica




Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo




Carta sinottica dell'Italia al suolo



Campo di vento superficiale



Campo di temperatura superficiale



Precipitazione

Situazione: Sull'Italia e sull'Europa centro-occidentale torna l'alta pressione e tenderà a rinforzarsi nei prossimi giorni.

Venti: deboli o localmente moderati nord-occidentali

Temperature: stazionarie


Fenomeni: assenti

3 Localizzazione delle postazioni di misura della Rete Regionale della Qualità dell'Aria di ARPALAZIO

Nelle cartine seguenti é riportata la dislocazione delle 34 postazioni chimiche fisse della rete di monitoraggio regionale di Qualità dell'Aria.

Il numero di postazioni per provincia é:

- Comune di Roma - N. 12
- Provincia di Roma - N. 7
- Provincia di Frosinone - N. 7
- Provincia di Latina - N. 4
- Provincia di Rieti - N. 2
- Provincia di Viterbo - N. 2



Provincia	Stazione	UTMX32m	UTMY32m	Quotaslm
Frosinone	Alatri	361795	4620836	437m
	Anagni	346161	4623334	362m
	Cassino	402393	4593644	37m
	Ceccano	361372	4603213	134m
	Ferentino	354406	4617166	309m
	Fontechiari	389648	4613897	400m
	Frosinone scalo	360957	4609405	153m
Latina	Aprilia 2	304742	4607766	74m
	Latina scalo	328965	4599981	15m
	V.Romagnoli	324022	4593452	22m
	V.Tasso	325810	4592618	18m
Rieti	Leonessa	343876	4710182	718m
	Rieti 1	324510	4697035	394m
Roma	Arenula	290554	4641077	16m
	Preneste	296187	4640161	30m
	Francia	290310	4647220	32m
	Magna Grecia	293390	4639980	40m
	Cinecitta'	298279	4637060	50m
	Colleferro oberdan	334074	4622005	216m
	Colleferro europa	334389	4621242	227m
	Allumiere	244606	4672105	533m
	Civitavechia	235184	4665295	20m
	Guidonia	311639	4651808	84m
	Segni	337785	4617584	242m
	Villa Ada	293420	4645180	53m
	Guido	273280	4641320	69m
	Cavaliere	305728	4646231	55m
	Ciampino	301510	4629980	138m
	Fermi	290050	4637980	11m
	Bufalotta	295660	4646980	45m
Cipro	288260	4642890	30m	
Tiburtina	296780	4643020	27m	
Viterbo	Civita castellana	287039	4685320	125m
	Viterbo	262311	4700699	340m

4 Sintesi delle medie settimanali

In tabella é riportata la media della concentrazione dei principali inquinanti rilevata nelle stazioni di rilevamento della rete di Arpalazio nella settimana di riferimento.

Provincia	Stazione	Benzene $\mu\text{g}/\text{m}^3$	CO mg/m^3	NO2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	NOX $\mu\text{g}/\text{m}^3$	O3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	PM2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Frosinone	Alatri	-	-	67	160	20	-	-
	Anagni	-	-	48	83	-	43	-
	Cassino	-	1.1	55	158	-	60	-
	Ceccano	-	-	38	147	-	-	-
	Ferentino	-	1.1	66	149	-	-	-
	Fontechiari	-	-	11	13	37	33	22
	Frosinone scalo	7.5	1.7	66	220	-	84	-
Latina	Aprilia 2	-	-	41	63	-	35	-
	Latina scalo	-	ND	ND	ND	-	-	-
	V.Romagnoli	6.1	1.1	91	244	-	-	-
	V.Tasso	-	0.9	54	127	26	42	-
Rieti	Leonessa	-	-	11	12	48	17	-
	Rieti 1	4.4	0.7	49	100	21	38	-
Roma	Arenula	-	-	74	185	-	39	23
	Preneste	2.9	-	47	124	12	39	-
	Francia	4.9	1.8	85	278	-	48	31
	Magna Grecia	3.9	1.2	86	194	-	40	-
	Cinecitta'	3.0	1.1	62	150	15	48	-
	Colleferro oberdan	-	0.7	50	122	13	-	-
	Colleferro europa	-	-	41	107	-	50	-
	Allumiere	-	-	8	11	-	10	-
	Civitavechia	-	0.6	32	51	-	26	-
	Guidonia	-	-	44	106	-	39	-
	Segni	-	-	29	60	23	-	-
	Villa Ada	2.1	0.6	50	89	10	31	24
	Guido	-	-	21	25	34	-	-
	Cavaliere	-	-	40	112	ND	-	-
	Ciampino	3.2	-	60	122	-	58	-
	Fermi	4.6	1.2	82	210	-	42	-
	Bufalotta	3.4	-	61	138	10	33	-
	Cipro	-	0.9	57	127	12	28	24
	Tiburtina	4.7	1.4	85	271	-	57	-
Viterbo	Civita castellana	-	-	43	102	-	30	-
	Viterbo	2.0	1.0	65	126	-	31	-

Note: Se in tabella é riportato il simbolo - l'analizzatore non é installato nella centralina.

Se in tabella é riportata la dicitura ND il dato non é disponibile.

La stazione di L.go Arenula é operativa dal 03.02.2008 presso il nuovo sito in P.zza Cairolì.

5 Standard della Qualità dell'Aria

Gli indicatori dello stato della qualità dell'aria riportati in tabella sono calcolati a partire dal 01.01.08 fino all'ultimo giorno della settimana di riferimento.

Gli standard di legge relativi al PM10 sono calcolati su base giornaliera.

Gli standard di legge relativi al NO₂, O₃ e Benzene sono calcolati su base oraria

La media di periodo è espressa in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Se in tabella è riportato il simbolo - l'analizzatore non è installato nella centralina

5.1 Provincia e Comune di Roma

Stazione	NO ₂		PM ₁₀	
	N.Superamenti 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo	N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo
Arenula	0	54	39	36
Preneste	0	43	56	38
Francia	0	79	71	40
Magna Grecia	3	69	46	36
Cinecitta'	0	46	39	33
Colleferro Oberdan	0	39	-	-
Colleferro Europa	0	35	57	37
Allumiere	0	9	1	10
Civitavechia	0	25	4	24
Guidonia	0	38	29	30
Segni	0	24	-	-
Villa Ada	0	33	16	27
Guido	0	19	-	-
Cavaliere	0	35	-	-
Ciampino	0	43	43	34
Fermi	3	78	47	38
Bufalotta	0	47	28	31
Cipro	5	52	23	29
Tiburtina	1	67	75	40

Stazione	O3		Benzene
	N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo
Arenula	-	-	-
Preneste	4	0	1.7
Francia	-	-	3.3
Magna Grecia	-	-	2.9
Cinecitta'	1	0	1.6
Colleferro Oberdan	0	0	-
Colleferro Europa	-	-	-
Allumiere	-	-	-
Civitavechia	-	-	-
Guidonia	-	-	-
Segni	0	0	-
Villa Ada	0	0	1.8
Guido	0	0	-
Cavaliere	7	0	-
Ciampino	-	-	1.4
Fermi	-	-	3.1
Bufalotta	0	0	2.4
Cipro	0	0	-
Tiburtina	-	-	3.1

5.2 Provincia di Frosinone

Stazione	NO2		PM10	
	N.Superamenti 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo	N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo
Alatri	5	44	-	-
Anagni	0	37	30	33
Cassino	0	50	57	36
Ceccano	0	37	-	-
Ferentino	0	52	-	-
Fontechiari	0	8	9	23
Frosinone Scalo	0	48	108	49

Stazione	O3		Benzene
	N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo
Alatri	1	0	-
Anagni	-	-	-
Cassino	-	-	-
Ceccano	-	-	-
Ferentino	-	-	-
Fontechiari	17	0	-
Frosinone Scalo	-	-	3.8

5.3 Provincia di Latina

Stazione	NO2		PM10	
	N.Superamenti 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo	N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo
Aprilia 2	0	24	4	25
Latina Scalo	0	38	-	-
V.Romagnoli	0	60	-	-
V.Tasso	0	38	24	29

Stazione	O3		Benzene
	N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo
Aprilia 2	-	-	-
Latina Scalo	-	-	-
V.Romagnoli	-	-	2.8
V.Tasso	0	0	-

5.4 Provincia di Rieti

Stazione	NO2		PM10	
	N.Superamenti 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo	N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo
Leonessa	0	7	3	15
Rieti 1	0	30	23	26

Stazione	O3		Benzene
	N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo
Leonessa	3	0	-
Rieti 1	0	0	2.1

5.5 Provincia di Viterbo

Stazione	NO2		PM10	
	N.Superamenti 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo	N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo
Civita Castellana	0	34	17	28
Viterbo	0	48	11	26




Stazione	O3		Benzene
	N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Media di periodo
Civita Castellana	-	-	-
Viterbo	-	-	1.8

6 Andamento Settimanale

6.1 Stazioni urbane

Nei due grafici seguenti é riportato l'andamento delle medie giornaliere della concentrazione di PM10 e NO2 rilevate nella settimana di riferimento nelle seguenti stazioni urbane dislocate sul territorio regionale:


- Francia - Comune di Roma
- Frosinone Scalo - Provincia di Frosinone
- Viterbo - Provincia di Viterbo
- Latina - Provincia di Latina
- Rieti - Provincia di Rieti



6.2 Stazioni di fondo


Nei due grafici seguenti é riportato l'andamento delle medie giornaliere della concentrazione di PM10 e NO2 rilevate nella settimana di riferimento nelle seguenti stazioni di fondo, urbano e regionale, dislocate sul territorio regionale:

- Ada - Fondo urbano, Comune di Roma
- Fontechiari - Fondo regionale, Provincia di Frosinone
- Leonessa - Fondo regionale, Provincia di Rieti



6.3 Rapporto della concentrazione di PM2,5 su PM10



Nel grafico seguente é riportato il rapporto della concentrazione giornaliera di PM2,5 e PM10 nelle postazioni in cui sono presenti entrambi gli analizzatori.



6.4 Variazione infragiornaliera

Nel grafico seguente é riportata la differenza della concentrazione tra due giorni consecutivi della intera settimana di riferimento.


I dati sono relativi alle stazioni urbane precedentemente selezionate.



6.5 Rapporto della concentrazione di NO₂ su NOX


$$\text{NOX(ppb)} = \text{NO(ppb)} + \text{NO}_2(\text{ppb})$$

Il rapporto NO_2/NOX rappresenta una misura della formazione di NO_2 , inquinante prevalentemente secondario, rispetto agli ossido di azoto totali-NOX.




6.6 Radiazione Globale

La radiazione globale é la quantità di energia solare che giunge al suolo. Essa é all'origine dei principali processi fotochimici e meteorologici che si osservano nella bassa atmosfera. Di seguito é riportata la radiazione cumulata durante le ore diurne.



6.7 Ozono

Nel grafico seguente é riportato l'andamento delle medie giornaliere della concentrazione di Ozono rilevate nella settimana di riferimento nelle stazioni indicate in legenda.



7 Link utili

- ARPA Lazio - <http://www.arpalazio.it>
- University of Wyoming, Department of Atmospheric Science - <http://weather.uwyo.edu/>
- Prev'air - <http://www.prevair.org>
- DREAM: Dust REgional Atmospheric Model - <http://www.bsc.es/projects/earthscience/DREAM/>
- EUMETSAT - <http://www.eumetsat.int>
- Eurometeo - <http://www.eurometeo.com>
- Aeronautica Militare - <http://www.am.it>
- Met Office - <http://www.metoffice.gov.uk>